

UBAVET^{MD}

Santé animale

GUIDE DE DOSAGE ET D'ADMINISTRATION



POSOLOGIE QUOTIDIENNE :

POIDS	DOSE
CHIENS	MILLILITRES
0-5 KG (10-11 LB)	2 ML
5,1-10 KG (12-22 LB)	3 1/2 ML
10,1-15 KG (23-33 LB)	5 ML
15,1-20 KG (34-44 LB)	7 ML
20,1-30 KG (45-66 LB)	9 ML
30,1-50 KG (67-110 LB)	12 ML
50,1 KG+ (110,1 LB+)	15 ML
CHATS	2 ML

**1 C. À THÉ = 5 ML
1 C. À SOUPE = 15 ML**

PASSEZ DE LA DOSE INITIALE À LA DOSE D'ENTRETIEN APRÈS 10 À 14 JOURS OU SELON LES BESOINS DE VOTRE COMPAGNON.



POSOLOGIE QUOTIDIENNE :

POIDS	DOSE
CHIENS	MILLILITRES
0-5 KG (10-11 LB)	2 ML
5,1-10 KG (12-22 LB)	3 1/2 ML
10,1-15 KG (23-33 LB)	5 ML
15,1-20 KG (34-44 LB)	7 ML
20,1-30 KG (45-66 LB)	9 ML
30,1-40 KG (67-88 LB)	11 ML
40,1-50 KG (89-110 LB)	14 ML
50,1-70 KG (110,1-154 LB)	18 ML
70,1 KG+ (154,1 LB+)	20 ML
CHATS	2 ML

**1 C. À THÉ = 5 ML
1 C. À SOUPE = 15 ML**

PASSEZ DE LA DOSE INITIALE À LA DOSE D'ENTRETIEN APRÈS 10 À 14 JOURS OU SELON LES BESOINS DE VOTRE COMPAGNON.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE L'ADAPTATEUR UBACAP ET DE LA SERINGUE

VEUILLEZ BIEN SUIVRE LE MODE D'EMPLOI DE LA SERINGUE ET DE L'ADAPTATEUR À PRESSION UBACAP^{MC} POUR SERINGUES.

MODE D'EMPLOI DE LA SERINGUE ET GUIDE D'ADMINISTRATION DE LA DOSE RECOMMANDÉE DE SUPPLÉMENTS UBAMEG, JOINT POWER MEG, JOINT PLUS ET UBAVIT.



- DÉBALLER LA SERINGUE ET L'ADAPTATEUR UBACAP^{MC}**

Réserver la seringue et l'adaptateur. Jeter l'emballage transparent de la bouteille.
- OUVRIR LA BOUTEILLE**

Dévisser le couvercle dans le sens antihoraire (vers la gauche), comme illustré. Retirer et jeter la pellicule protectrice du goulot de la bouteille.
- INSÉRER L'ADAPTATEUR POUR SERINGUES**

Placer la bouteille sur une surface plane. Tenir fermement la bouteille, puis enfoncer complètement l'embout nerveuré de l'adaptateur à pression UBACAP^{MC} pour seringues dans le goulot. Le petit trou devrait faire face au plafond.

Remarque : Ne pas retirer l'adaptateur pour seringues de la bouteille après l'avoir inséré.
- BIEN AGITER LA BOUTEILLE**

Revisser fermement le couvercle et agiter vigoureusement la bouteille pendant cinq secondes. Comme le contenu peut se séparer, le fait de remuer permettra de le reconstituer.

AGITER PENDANT AU MOINS 5 SECONDES
- ÉLIMINER L'AIR DE LA SERINGUE**

Enfoncer complètement le piston dans le corps de la seringue pour éliminer l'air.
- INSÉRER LA SERINGUE DANS L'ADAPTATEUR**

Dévisser le couvercle de la bouteille. Tenir la bouteille en position verticale et bien insérer l'embout de la seringue dans l'ouverture de l'adaptateur.
- EXTRAIRE LA DOSE DE LA BOUTEILLE**

Une fois la seringue bien en place, renverser la bouteille. Tirer sur le piston jusqu'à ce que le bas du piston soit aligné à la marque correspondant à la dose désirée (voir l'étiquette du produit pour le dosage). Si d'importantes bulles d'air se forment, vider la seringue dans la bouteille en enfonceant complètement le piston, puis répéter cette étape. Des petites bulles sont acceptables.
- RETIRER LA SERINGUE**

Redresser la bouteille. Retirer la seringue en tirant le corps de la seringue vers le haut.
- VÉRIFIER LA DOSE**

Vérifier la dose prélevée. Si la dose est incorrecte, insérer fermement l'embout de la seringue dans l'ouverture de l'adaptateur et vider son contenu dans la bouteille. Répéter les étapes 6 et 7.
- ADMINISTRER LE PRODUIT**

Enfoncer le piston pour vider le contenu de la seringue directement dans la bouche de l'animal ou sur ses aliments.
- NETTOYER ET ENTRETIENIR LA SERINGUE**

Pour débloquer une seringue coincée, remplir une tasse d'eau chaude et y ajouter un peu de savon à vaisselle. Plonger l'embout de la seringue dans la tasse, puis enfoncer et tirer sur le piston quelques fois pour faire circuler l'eau dans le corps de la seringue jusqu'à ce que le piston glisse de nouveau fluidement. Répéter cette opération avec de l'eau chaude seulement pour rincer la seringue. Laisser la seringue sécher à l'air libre avec le piston complètement enfoncé. Conserver la seringue jusqu'à ce que la bouteille soit vide, puis la jeter.
- FACULTATIF DOSER À L'AIDE D'UNE CUILLÈRE À THÉ OU À SOUPE**

Si la seringue ne fonctionne plus, doser le produit à l'aide d'une cuillère à thé ou d'une cuillère à soupe. Une cuillère à thé et une cuillère à soupe correspondent à 5 mL et 15 mL de liquide respectivement.

1 C. À SOUPE = 15 ML
1 C. À THÉ = 5 ML
- RANGEMENT**

De nombreux clients d'UBAVET laissent la seringue dans la bouteille, tandis que d'autres préfèrent revisser le couvercle de la bouteille après chaque utilisation. Ces deux options sont acceptables.

SENS HORAIRE

Conserver le produit à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Bien agiter avant chaque utilisation.